

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-5-71 185459

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN n° 128 de MAI 1971

12 MAI 1971 / n° 11

ARBRES FRUITIERS

Tavelures du pommier - poirier : Les premières taches de tavelure du pommier ont été relevées dans certains vergers le 10 mai. Elles font suite aux contaminations provoquées par les pluies du 25-26 avril. Il y a lieu de prévoir avant les prochaines pluies une protection des plus soignées des arbres.

En cas de précipitations supérieures à 15 mm renouveler le plus rapidement possible la protection du verger.

Oïdium du pommier : Couper les rameaux atteints et ajouter à la bouillie un anti-oïdium. Tenir compte des températures élevées pouvant provoquer des brûlures sur le feuillage de certaines variétés : Richared, Cox's orange....

Pucerons (Pucerons verts et pucerons cendrés) : Le temps chaud a été très favorable à la multiplication de ces deux espèces qui sont présentes dans tous les vergers. Intervenir dans les prochains jours à l'aide d'un insecticide systémique.

Monilia sur cerisier, prunier : Profiter du beau temps actuel pour éliminer les brindilles atteintes, renouveler la protection des arbres.

GRANDE CULTURE

Pégomyie de la betterave : Malgré le temps chaud et sec les pontes sont toujours très nombreuses. Toutefois on observe des avortements et une mortalité parfois importante de jeunes larves, consécutifs aux conditions climatiques.

Surveiller attentivement les betteraves n'ayant pas encore reçu de protection.

Pour les cultures traitées l'efficacité de l'insecticide ne saurait dépasser 8 jours par suite d'une importante extension foliaire; elles devront donc être à nouveau examinées passé ce délai.

Compte-tenu d'une meilleure activité végétative et d'une certaine mortalité des jeunes larves il est conseillé de ne traiter qu'en fonction de mines déjà bien formées mais avant qu'elles ne soient dommageables au feuillage.

Puceron noir de la betterave : Les colonies du puceron noir sont en très nette extension. Eventuellement dans les cultures sérieusement envahies (par exemple une betterave sur dix), utiliser un produit mixte pégomyie-puceron, à dose adéquate.

Charançon des siliques du colza d'hiver : Comme prévu les concentrations de ce charançon se sont intensifiées depuis quelques jours. Nous rappelons notre précédent avis recommandant un traitement pendant la période du 10 au 15 mai.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

H. de MEIRLEIRE et A. GODIN

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE,

J. DELATTRE